


Zeolitter fra Refsalen, Sannidal, Kragerø

Vegard Evja

Kolonien 4, 3772 Kragerø (vegard.evja@live.no)

Sæbø og Reitan (1959) beskrev zeolitter (natrolitt, stilbitt, heulanditt og laumontitt) fra slepper i gneis nær Østland, omkring 1,5 km NNV for Kragerø by. Det er derfor interessant at det nok en gang blir funnet zeolitter nær Kragerø. Under sprenging og opparbeiding av næringstomter ved Refsalen i Sannidal, 6 km NV for Kragerø (Fig. 1), var det et område i amfibolitt med ganger rike på druser med chabazitt som rødoransje krystaller med opptil 1 cm sidekant (Fig. 2), stilbitt i aggregater og vifter opptil 2,5 cm (Fig. 3), samt analcimkrystaller opptil 1,5 cm i diameter.



Figur 1. Kart over området ved Refsalen i Sannidal. Zeolitt-lokaliteten er angitt med rødt punkt.



Figur 2. Chabazitt opptrer som rødoransje krystaller. Støffen er 6 cm bred.



Figur 3. Aggregater og vifter av stilbitt. Stuffen er ca. 9 cm bred.

Etterord

Tomten er nå nedbygd og forekomsten er dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Referanse

Sæbø, P.C. & Reitan, P. (1959): An occurrence of zeolites at Kragerø, southern Norway. *Norges Geologiske Undersøkelse* **205**, 174-180.